



ÄRZTEHAUS
in der alten Druckerei



ÄRZTEHAUS
in der alten Druckerei

SPRECHZEITEN


Mo, Di, Do:
8:00 – 16:00 Uhr

Mi, Fr:
8:00 – 13:00 Uhr

Bülowstraße 5
46562 Voerde

Telefon: 0281/44440
info@aerztehaus-voerde.de

www.aerztehaus-voerde.de



**ANEURYSMA DER
BAUCHSCHLAGADER**

Informationen zur Früherkennung

Früherkennung kann Leben retten

Es ist wichtig, Veränderungen an der Bauchschlagader frühzeitig zu erkennen. Mit der Früherkennungsuntersuchung bei Männern ab 65 Jahren lassen sich die Ausbuchtungen frühzeitig aufspüren und gegebenenfalls behandeln. So kann verhindert werden, dass ein Bauchaortenaneurysma reißt.

• Vorsorgeuntersuchung für Männer

Männer sind wesentlich häufiger von einem Bauchaortenaneurysma betroffen als Frauen. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen Männern daher ab 65 Jahren eine einmalige Ultraschall-Untersuchung zur Früherkennung.

Diese einfache und schmerzfreie Untersuchung soll eine Ausbuchtung erkennen, bevor sie gefährlich wird. Wird ein Aneurysma entdeckt, hängt die weitere Behandlung vor allem von der Größe der Ausbuchtung und der Entwicklung des Aneurysmas ab. Kleinere Erweiterungen werden in regelmäßigen Abständen mit Ultraschall kontrolliert. Ab einer Größe von 5,5 Zentimetern empfehlen Experten jedoch meist eine Operation.

• Erweiterte Bauchschlagader kann lebensbedrohlich sein

Die Bauchschlagader – oder auch Bauchaorta genannt – ist das größte Blutgefäß im Bauch. Mit zunehmendem Alter kann das Gewebe der Bauchaorta weniger stabil werden. Manchmal dehnt sich die Schlagader an einer Stelle deutlich und es bildet sich eine Ausbuchtung – ein sogenanntes Aneurysma. Betroffene merken davon nichts. Es besteht jedoch das Risiko, dass das Aneurysma reißt. Dann besteht Lebensgefahr. Viel Blut fließt ungehindert in den Bauchraum und es können plötzlich heftige Rücken- und Bauchschmerzen auftreten.

HÄUFIGE FRAGEN:

Woher kommt ein Aneurysma im Bauch?

Ein Aneurysma der Bauchschlagader kann entstehen, wenn die Elastizität der Gefäßwand nachlässt, zum Beispiel durch Rauchen oder weil das Gefäß stark belastet wird, etwa aufgrund von Bluthochdruck. Aber auch Fettstoffwechselstörungen, Diabetes, Arteriosklerose, übermäßiger Alkoholgenuß birgen ein Risiko. Auch der normale Alterungsprozess trägt dazu bei.

Kündigt sich ein Aneurysma an?

Ein Bauchaortenaneurysma kündigt sich in der Regel nicht an. Deshalb ist die Früherkennung so wichtig. Die Ausbuchtung der Bauchschlagader macht noch keine Beschwerden. Sie kann aber reißen.

Wie erfolgt die Untersuchung?

Der Arzt oder die Ärztin führt eine Ultraschalluntersuchung des Bauchraums durch. Dabei werden die Organe und Gewebsstrukturen untersucht. So können schnell und zuverlässig Ausbuchtungen und Schwachstellen erkannt werden. Der gesamte Vorgang ist schmerzfrei und nicht invasiv.

Und wenn eine Operation nötig ist?

Ein Bauchaortenaneurysma kann auf verschiedene Weisen operiert werden, abhängig von der Größe, Lage und Form des Aneurysmas sowie vom Gesundheitszustand des Patienten. Nicht immer ist jedoch eine Operation notwendig und es gibt alternative Behandlungsmethoden.

Führen Sie einen gesunden Lebensstil und beugen Sie so einem Bauchaortenaneurysma vor.

Sollten Sie noch Fragen zu dieser Untersuchung haben, sprechen Sie uns gerne an.